

# Al·lèrgia a medicaments

---

Els medicaments poden provocar efectes no desitjats o adversos, i una minoria d'aquests són causats per l'al·lèrgia al fàrmac. Les reaccions al·lèrgiques als medicaments son imprevisibles i depenen d'una resposta immunològica.



Les al·lèrgies que son mitjançant la immunoglobulina E (IgE), apareixen de manera immediata al prendre el medicament (normalment amb la primera o segona dosi), i la manifestació clínica mes freqüent es la erupció cutània pruriginosa amb o sense inflor, o bé es pot presentar com una anafilaxi (una reacció al·lèrgica generalitzada que pot posar en perill la vida del pacient). Un dels medicaments que amb més freqüència es relaciona amb reaccions al·lèrgiques son els antibiòtics, per exemple la penicil·lina.

Hi ha, però, altres tipus d'al·lèrgies a medicaments. Algunes persones tenen al·lèrgies de tipus retardat com les de contacte, per exemple un èczema en el lloc d'aplicació d'una crema antiinflamatòria.

Els estudis d'al·lèrgia a fàrmacs no tenen valor predictiu (no podem predir si tindrè en el futur al·lèrgia a un medicament que no he pres), i les proves es realitzen en base a les reaccions produïdes i els medicaments sospitosos de induir-les. El diagnòstic es amb la informació clínica del pacient, proves de laboratori, proves cutànies i prova d'exposició controlada si es possible.

**Per mes informació pot dirigir-se:**

Libro de las Enfermedades Alérgicas de la Fundación del BBVA

<http://www.alergiafbvva.es/>

Sociedad Española de Alergia y Inmunología Clínica - SEAIC

<http://www.seaic.org/>

European Academy of Allergy and Clinical Immunology

<http://www.eaaci.org/patients/>

L 'informació proveïda en aquesta pàgina no està dissenyada per reemplaçar les instruccions del seu metge especialista. L 'informació està dissenyada per donar suport i no reemplaçar la relació entre el pacient i el seu metge especialista.